

# 直肠/乙状结肠镜

Rekto-/sigmoideoskopi



温馨提示：

请仔细阅读本手册内容。如果没有按规定做好检查前准备，检查可能会无法进行。



Lovisenberg Diakonale Sykehus

Lovisenberg Diakonale Sykehus  
Medisinsk poliklinikk  
Lovisenberggt. 17  
Telefon: 2322 5720

10.2019 Mandarin



Lovisenberg Diakonale Sykehus

## 什么是直肠/乙状结肠镜?

直肠/乙状结肠镜是对直肠和乙状结肠的检查。检查时医生将柔性管插入直肠，目的是检测该部位是否有病变，也可以切除肠黏膜上较小的肿瘤或息肉。

## 检查前准备

检查前一天您应喝大量的液体。检查前5天开始您应避免食用含整谷粒/亚麻籽的面包以及水果/莓的籽或核。

到肠胃科化验室时，护士会给您灌肠剂，使肠道的下半部分被清空，以便医生清晰地观察肠道黏膜。

## 药物过敏及其它疾病:

如果您有药物过敏或患有心脏痛、心力衰竭、月经不调等，请务必告知，因为此信息会影响对检查方法的选择。

## 如果您服用影响出血时间的药物，请遵守下列规定:

- 如果您服用阿司匹林 (Albyl-E)，在未有其它医嘱情况下可以一直服用到检查当天。
- 如果您服用波立维/替格瑞洛/盐酸普拉格雷 (Plavix/Brilique/Efient)，请在检查之前与我们联系。
- 如果您服用拜瑞妥/阿哌沙班/泰毕全 (Xarelto/Eliquis/Pradaxa)，请在检查前2天停止服用。
- 如果您服用华法林 (Marevan)，请在检查前3天停止服用。因为检查前须到我院化验室来检测INR (国际标准化比值)，所以您应至少提前1小时到达内科门诊并在前台报到。
- 如果您体内植入了机械心脏瓣膜，请务必事先和门诊联系，以便医生事先制订从华法林 (Marevan) 到法安明 (Fragmin) 的换药计划。

## 检查过程

检查时间为15-30分钟，检查中可能会有腹胀痛的不适感。

## 检查后

介绍您来的医生几天后会收到检查结果。如做了活检，医生4-6个星期后会收到化验结果。

## 并发症?

直肠/乙状结肠镜检查后的并发症并不常见。如果进行了活检取样或切除息肉，在黏膜上会留下一个小伤口。出血情况罕见，检查3-4天后有可能发生，但通常会自动停止。

如果怀疑肠壁受伤，请联系您的固定医生或本院内科门诊值班医生 (电话: 23 22 50 00)。

本院医生不负责开病假条，但可以出具您当日来医院检查的医生证明。