

Recto-/sigmoideoskopi



¡Importante!

Lea atentamente la información del folleto ya que la falta de preparación puede hacer que la exploración no se pueda realizar



Lovisenberg Diakonale Sykehus

Lovisenberg Diakonale Sykehus
Medisinsk poliklinikk
Lovisenberggt. 17
Telefon: 2322 5720

Recto-/sigmoideoskopi 02-2020 spansk



Lovisenberg Diakonale Sykehus

¿Qué es una sigmoidoscopia?

La rectosigmoidoscopia es una exploración del recto y parte inferior del colon.

Un tubo flexible se introduce a través del orificio anal (recto). Con esta exploración se pueden detectar cambios en la zona a explorar y eliminar pequeños tumores o pólipos en la mucosa.

Preparación para la exploración

Debe beber líquido en abundancia el día antes de la prueba. Debe evitar comer pan con grano integral, semilla de lino y pequeñas semillas de frutas y bayas **los 5 últimos días** antes de la exploración.

Cuando llegue al laboratorio de gastroenterología se le entrega un enema, es para el vaciado de la parte inferior del intestino y de esa forma poder ver la mucosa del intestino lo mejor posible.

Medicamentos y otras enfermedades

Debe informarnos si tiene intolerancia/alergia a algún medicamento o si tiene enfermedades como angina de pecho, insuficiencia cardíaca o trastornos de la coagulación, ya que esto puede afectar a la elección del procedimiento en sí.

Las siguientes precauciones se aplican a las medicinas que afectan a la coagulación

- Si está tomando **Albyl-E** y no ha recibido ninguna notificación que indique lo contrario, puede seguir tomando la medicación hasta el día de la exploración.
- Si está tomando **Plavix/Brilique/Efient**, debe ponerse en contacto con nosotros antes de la exploración.
- Si está tomando **Xarelto/Eliquis/Pradaxa**, debe dejar de tomarlo 2 días antes de la exploración.

- Si está tomando **Marevan** debe dejar de tomarlo 3 días antes de realizar la exploración, el INR es controlado por nuestro laboratorio. Por esta razón deberá de presentarse como mínimo 1 hora antes de realizar la exploración y notificar su llegada en el mostrador del ambulatorio.
- Si tiene **implantada una válvula cardíaca**, debe de ponerse en contacto con el ambulatorio para planificar el cambio de Marevan a Fragmin.

La exploración

La exploración tarda aproximadamente de 15 a 30 minutos. Durante el examen médico puede notar un desagradable malestar producido por gases.

Después de la exploración

Los resultados de las pruebas se envían al médico que le ha remitido en 1 o 2 semanas. Si se han tomado pruebas de tejido, el médico que le ha remitido recibirá los resultados entre 4 a 6 semanas.

Si lo necesita puede recibir un informe donde conste que ha estado en el hospital realizando un examen médico. La baja por enfermedad no la da el médico del hospital.

Complicaciones?

En una rectosigmoidoscopia rara vez surgen complicaciones. Cuando se toman pruebas de tejido o se extirpa un pólipo, surge una pequeña herida en la mucosa intestinal. No suele sangrar, pero en los 3-4 días siguientes después de la exploración puede que surja algún sangrado, normalmente suele detenerse espontáneamente.

Si tiene alguna sospecha de daños en la pared intestinal, póngase en contacto con su médico o con el médico de guardia de medicina interna del hospital. Telf.: 23 22 50 00.