

Cromoendoscopia



¡Información importante!

- Antes de llevar a cabo el procedimiento de la colonoscopia, debe realizar un vaciado intestinal– Ver explicación aparte. Un vaciado intestinal incompleto puede significar que la colonoscopia no se pueda realizar o la prueba sea inválida.
- Debe realizar algunos cambios en su dieta los últimos 5 días antes de la exploración. – Ver explicación aparte.
- Si está tomando medicamentos anticoagulantes, puede que sea necesario realizar una pausa en la toma de estos medicamentos. Ver explicación aparte.



Lovisenberg Diakonale Sykehus

Lovisenberg Diakonale Sykehus
Medisinsk poliklinikk
Lovisenberggt. 17
Telefon: 2322 5720



¿Que es la Cromoendoscopia?

La Cromoendoscopia es una exploración del recto y del intestino grueso (colonoscopia). Un tubo flexible se introduce en el recto y se riega la mucosa intestinal con un líquido colorante para que sea más fácil detectar los cambios en la mucosa del recto y del intestino grueso (colon).

Preparación para la exploración:

1. **Vaciado intestinal:** [Ver informacion adjunta](#)
2. **Comida y bebida:** [Ver informacion adjunta](#)

Medicamentos y otras enfermedades

Debe informarnos si tiene **intolerancia/alergia** a algún medicamento o si tiene enfermedades como angina de pecho, insuficiencia cardiaca o trastornos en la coagulación, ya que puede afectar a la elección del procedimiento en sí.

Medicamentos que afectan a la coagulación:

- Si está tomando **Albyl-E** y si no ha recibido ninguna notificación que indique lo contrario, puede seguir tomándolo hasta el día de la exploración.
- Si está tomando **Plavix/Brilique/Efient**, debe ponerse en contacto con nosotros, como mínimo 1 semana antes de la exploración.
- Si está tomando **Xarelto/Eliquis/Pradaxa**, debe dejar de tomarlo 2 días antes de la exploración.
- Si está tomando **Marevan** debe dejar de tomarlo 3 días antes de la exploración, el INR es controlado por nuestro laboratorio. Por esta razón debe presentarse como mínimo 1 hora antes de la exploración y notificar su llegada en el mostrador del ambulatorio.
- Si le han implantado una válvula cardiaca, **debe ponerse en contacto con la clínica** para planificar el cambio de Marevan (Sintrom) a Fragmin.

Procedimiento

La exploración dura de 1 a 1.5 horas. Durante la exploración puede que sienta una sensación desagradable de dolor a causa de los gases que se producen durante la exploración. En caso de que sea necesario se le administraran calmantes o sedantes. Si esto fuera así, se le colocara una vía intravenosa en el brazo.

Después de la exploración

Si se le han administrado sedantes, deberá descansar en planta de 1 a 2 horas después de la exploración. No puede conducir después de haber realizado la exploración.

Los resultados de la prueba tardaran unos días y se envían al médico que le ha remitido. Si se han tomado muestras de tejido, los resultados tardaran de 4 a 6 semanas y se le envían al médico que le ha remitido.

Llévese algo de comer para después de la exploración.

Si lo necesita puede obtener un certificado médico que confirme que ha realizado un examen médico. La baja por enfermedad no la da el médico del hospital

¿Complicaciones?

Rara vez surgen complicaciones en una Cromo-endoscopia. Cuando se toman pruebas de tejido o se extirpa un pólipo, surge una pequeña herida en la mucosa intestinal. No suelen surgir hemorragias, pero puede que durante los 3-4 días siguientes a la exploración surja algún sangrado. Normalmente se detiene espontáneamente.

Si tiene sospecha de daños en la pared intestinal, póngase en contacto con su médico o con el médico de guardia de medicina interna del hospital. Telf.: 23 22 50 00.