



قياس الأس الهيدروجيني لدرجة الحموضة في المريء على مدار 24 ساعة.

الغاية

الغاية من قياس الأس الهيدروجيني على مدار 24 ساعة هو قياس درجات الحموضة في المريء.

الاستعداد

الأدوية المثبطة للأكسجين (مثبطات مضخة البروتون Protonpumphehemmend) مثل أوميبرازول Omeprazo، إيسوميبرازول Esomeprazol (لوسيك Losec / نيكسيوم Nexium)، بانتوبرازول Pantoprazol (سوماك Somac) أو لانزوبرازول Lanzoprazol (لانزو Lanzo)، يجب أن تتوقف على تناولها 7 أيام قبل الفحص

أدوية أخرى مثبطة للأحماض، تسمى مُحصرات الهيدروجين H2 مثل تغم Tagamet، بيب سيد Pepcid وزانطاك Zantac، يجب عليك التوقف على تناولها يومين قبل إجراء الاختبار.

الأدوية التي تُحايد الأحماض مثل لينك Link ونوفالوزيد Novaluzid جافيسكو Gaviscon (ضادات حرقة المعدة)، يجب عليك التوقف عن تناولها المساء ما قبل إجراء الاختبار. ويجب عليك الصيام لمدة ست ساعات قبل إجراء الاختبار وهذا يعني أن تتوقف عن الأكل. ومع ذلك يمكنك شرب كأس ماء حتى ساعتين قبل الاختبار إذا عطشت.

الفحص ذاته

يتم تمرير مسبار رفيع (2 مم) عبر فتحة الأنف، عبر المريء وصولاً إلى المعدة، سعياً في توثيق البيئة الحمضية. يتم وصل المسبار إلى جهاز مسجل يقيس درجة الأس الهيدروجيني بشكل مستمر ليوم واحد. يجب عليك ارتداء زام يمكن ربط الجهاز المسجل به. يتم تخزين بيانات قياس في هذا الجهاز المسجل.

مهم أن تعيش كالمعتاد خلال فترة إجراء الاختبار على مدار 24 ساعة من حيث تناول الوجبات الأنشطة والعمل. بهذه الطريقة، تعكس قياسات هذا الاختبار حالتك على وجه أصح في يوم عادي ولتتقوم بالمهام اليومية.

انتهاء الفحص

بعد مرور 24 ساعة، يمكنك العودة إلى gastrolab / مختبر الجهاز الهضمي مع جهاز التسجيل، ويتم سحب المسبار.

مضاعفات

نادراً ما تقع مضاعفات عند إجراء الاختبار.

بعد الفحص

بعد الفحص، ليس من الضروري أخذ أي اعتبارات خاصة، ويمكنك العودة إلى تناول نفس الادوية الحمضية.

نتائج الاختبار

يتم إخبار الطبيب الذي أحالك بنتيجة هذا الفحص.
قد تحصل أحياناً على إشعار بموعد جديد للمتابعة عند طبيب هنا.

عند الحاجة، يمكنك الحصول على إثبات خطي بأنك حضرت لإجراء هذا الاختبار الطبي.
الإجازة المرضية لن يتم تحريرها من قبل طبيب المستشفى.