

# 胃镜 Gastroskopi



温馨提示：

请务必仔细阅读检查前所需准备工作



Lovisenberg Diakonale Sykehus

Lovisenberg Diakonale Sykehus  
Medisinsk poliklinikk  
Lovisenberggt. 17  
Telefon: 2322 5720

Gastroskopi 10.2019 Mandarin



Lovisenberg Diakonale Sykehus

## 什么是胃镜？

胃镜是对食道、胃和十二指肠上部的检查。检查时医生将柔性管从病人口腔插入，目的是检测黏膜是否有病变，也可以进行活检取样或治疗。

## 乳糜泻？

如果胃镜检查是诊断乳糜泻的一个环节，请您在检查前至少6星期开始进食正常的含麸质食品，以检测您是否对麸质有过敏反应。

如果胃镜检查是乳糜泻饮食治疗的一年复查，请您在检查前进食无麸质食品。

如有疑问，请及时与我们联系！

## 检查前准备

您必须在检查前6小时开始空腹，也就是说检查前6小时不能进食。如果口渴，到检查前2小时为止可以喝一杯水。

## 药物过敏及其它疾病：

如果您有药物过敏或患有心绞痛、心力衰竭、月经不调等，请务必告知，因为此信息会影响对检查方法的选择。

## 影响出血时间的药物：

- 如果您服用**阿司匹林 (Albyl-E)**，在未有其它医嘱情况下可以一直服用到检查当天。
- 如果您服用**波立维/替格瑞洛/盐酸普拉格雷 (Plavix/Brilique/Efient)**，请在检查之前与我们联系。
- 如果您服用**拜瑞妥/阿哌沙班/泰毕全 (Xarelto/Eliquis/Pradaxa)**，请在检查前2天停止服用。
- 如果您服用**华法林 (Marevan)**，请在检查前3天停止服用。因为检查前须到我院化验室来检测INR（国际标准化比值），所以您应至少提前1小时到达内科门诊，并在前台报到。
- 如果您体内植入了机械心脏瓣膜，**请务必事先和门诊联系**，以便医生事先制订从华法林 (Marevan) 到法安明 (Fragmin) 的换药计划。

## 抑酸药物：

如果您服用如奥美拉唑 (Omeprazol)，埃索美拉唑 (Esomeprazol/Losec/Nexium)，泮托拉唑 (Pantoprazol/Somac) 或兰索拉唑 (Lansoprazole /Lanzo) 等药物，**在未有其它医嘱情况下请您务必在检查前7天停药。**

如果您服用H<sub>2</sub>受体阻剂类抑酸药物如泰胃美 (Tagamet)、法莫替丁 (Pepcid) 和善胃得 (Zantac)，**请您务必在检查前2天停药。**

## 检查过程

检查时间一般为5-10分钟。如果您要求通过静脉注射镇静药，由治疗医生决定是否满足您的要求。

## 检查后

如果在检查中使用了镇静剂，检查后您应在诊所休息1-2小时，当日不能开车。

如果检查中只进行了咽部局部麻醉，检查稍后您即可回家。

您需要在检查后等待30-60分钟才能进食或饮水，以避免“有碍”。

介绍您来的医生几天后会收到检查结果。如做了活检，医生4-6个星期后会收到化验结果。

本院医生不负责开病假条，但可以出具您当日来医院检查的医生证明。

## 并发症？

检查后的并发症并不常见。如果回家后感觉不适，请联系您的固定医生或本院内科门诊值班医生（电话：23 22 50 00）。