



تنظير المعدة

□ لاحظة!

اقرأ بعناية معلومات التحضير للاختبار

ما هو تنظير المعدة ؟

تنظير المعدة هو فحص المريء والمعدة والجزء العلوي من الاثني عشر. يتم إدخال أنبوب مرن عبر الفم. قد يُمكن الاختبار من كشف التغيرات في الأغشية المخاطية، كما يمكن علاج الحالات المرضية أو أخذ عينات من الأنسجة.

مرض الداء البطني (الداء الزلاقي/ السيلياك) ؟

إذا تم الاختبار كجزء من توضيح حالة مرض السيلياك، فيجب أن تأكل غذاء طبيعي يحتوي على الغلوتين لمدة 6 أسابيع على الأقل قبل إجراء الفحص للكشف عن ردود فعل محتملة على الغلوتين.

إذا كان الاختبار عبارة عن مراجعة طبية سنوية بعد اتباع نظام غذائي علاجي للسيلياك ، فعليك تناول غذاء خاليًا من الغلوتين قبل الاختبار. إذا عندك شك، اتصل بنا!

الاستعدادات للفحص

عليك الصيام 6 ساعات قبل الفحص. هذا يعني أنه يجب عليك ألا تتناول □ شيئًا خلال □ 6 ساعات. يمكنك شرب كأس □ ماء □ و □ د □ حتى ساعتين قبل الإختبار إذا كنت عطشانًا.

الأدوية وغيرها □ ن الأراض

عليك تزويدنا بمعلومات حول الأدوية التي لا تحملها، وكذلك الأمراض مثل الذبحة الصدرية، وفشل القلب أو اضطرابات النزيف، بما أن هذا قد يؤثر على اختيار الإجراء.

الأدوية التي تؤثر على فترة النزيف:

- إذا كنت تستخدم ألبيل - Albyl-E ، فيمكنك الاستمرار في ذلك حتى يوم الاختبار إذا لم تتلق أي تعليمات أخرى.
- إذا كنت تستخدم بلافيكس Plavix / بريليك Brilique / إيفيننت Efient ، فعليك الاتصال بنا قبل إجراء الاختبار.
- إذا كنت تستخدم غزارلطو Xarelto / إيليكس Eliquis / برادكسا Pradaxa ، فعليك إيقافه يومين قبل الإجراء.
- إذا كنت تستخدم مريفان Marevan ، فعليك إيقافه 3 أيام قبل الإجراء كما يجب فحص تخثر الدم (INR) في مختبرنا. لذا فعليك الحضور على الأقل ساعة قبل الاختبار وإخبار بذلك عند ما توجه إلى منصة الاستعلامات للعيادة الطبية الخارجية.
- إذا كنت خضعت لعملية صمام قلب ميكانيكي، فعليك الاتصال بالعيادة الطبية الخارجية للتخطيط لتغيير دواء مارفان Marevan وتعويضه بدواء فراغمين Fragmin مقدمًا.

الأدوية المثبطة للحمض.

مثل أوميبرازول Omeprazole ، إيسوميرازول Esomeprazol، (ولوزيك Losec / نيكسيوم Nexium)، إيسوميرازول Esomeprazol، بانتوبرازول Pantoprazole (سوماك Somac) أو لانزوبرازول Lanzoprazole (لانزو Lanzo)، يجب التوقف عن تناولها 7 أيام قبل إجراء الاختبار ما لم تحصل على تعليمات أخرى.

أدوية أخرى تثبط الأحماض، تسمى حاصرات H2 مثل تاغامت Tagamet، بيبسيد Pepcid و زانطاك Zantac ، يجب التوقف عن تناولها يومين قبل إجراء الاختبار.

الاختبار ذاته

يستغرق هذا الاختبار في العادة من 5 إلى 10 دقائق. إذا كنت بحاجة إلى دواء مسكن عن طريق الوريد، فسيتم تقييمه من قبل الطبيب المعالج.

بعد الاختبار

إذا حصلت على دواء مسكن، فيجب عليك الراحة في القسم لمدة تتراوح بين 1-2 ساعات بعد الاختبار. لا يمكنك قيادة السيارة في يوم إجراء هذا الفحص.

إذا حصلت على تخدير موضعي في حلقك، فيمكنك العودة إلى المنزل بعد فترة وجيزة من الاختبار.

يتحتم عليك الانتظار لمدة 30-60 دقيقة بعد الاختبار قبل الأكل أو الشرب لتتجنب الابتلاع "بالمقلوب" أي على نحو خاطئ.

سيتم إبلاغ الطبيب الذي احالك لبنتائج هذا الفحص في غضون بضعة أيام. إذا تم أخذ عينات من الأنسجة، فسيتم إبلاغ الطبيب الذي احالك النتيجة بعد 4-6 أسابيع تقريبا.

لا يتم تحرير لإجازة مرضية ليوم إجراء الفحص من قبل طبيب المستشفى، لكن يمكنك الحصول على تصريح بحضورك لإجراء الفحص.

مضاعفات؟

نادرا ما تحصل مضاعفات جراء تنظيف المعدة. إذا استاءت حالتك بعد عودتك إلى المنزل، اتصل بطبيبك أو طبيب الحراسة في العيادة الطبية هنا بالمستشفى.

الهاتف. 23 22 50 00