

ese día.

Si solo le han administrado sedante local en la garganta, puede irse a casa al poco tiempo después de la exploración.

Debe esperar a comer o beber entre 30 a 60 minutos para evitar atragantamiento.

Los resultados de las pruebas se envían al médico que le ha remitido, suelen tardar algunos días.

Si se han tomado pruebas de tejido, el médico que le ha remitido recibirá los resultados entre 4 y 6 semanas.

Si lo necesita puede obtener un informe que confirme que usted ha realizado un examen médico. El médico del hospital no da la baja por enfermedad.

¿Complicaciones?

No suelen surgir complicaciones en una exploración de gastroscopia.

Si el día después de la exploración Usted se siente con malestar, póngase en contacto con su médico o con el médico de guardia de medicina interna del hospital en el telf.: 23 22 50 00.

Gastroscopia



Importante!

Lee atentamente la información sobre los preparativos para la exploración.



Lovisenberg Diakonale Sykehus

Lovisenberg Diakonale Sykehus
Medisinsk poliklinikk
Lovisenberggt. 17
Telefon: 2322 5720



¿Qué es una gastroscopia?

La gastroscopia es una exploración del esófago, estómago y parte alta del tubo digestivo (duodeno)

Un tubo flexible delgado se introduce a través de la boca. En esta exploración se puede detectar cambios en las membranas mucosas y se pueden tratar enfermedades o tomar muestras de tejido.

¿Celiaquía?

Si el procedimiento se realiza como parte de una exploración de la enfermedad celiaca, usted deberá de haber ingerido alimentos con contenido en gluten al menos 6 semanas antes de realizar la exploración, para así poder detectar posibles reacciones al gluten.

Si la exploración es parte del control anual post-celiaco, usted debe tomar una dieta libre de gluten antes del examen médico.

¡En caso de dudas, póngase en contacto con nosotros!

Preparación para la exploración:

Debe ayunar **6 horas antes** de la exploración. Esto significa que **NO** puede comer nada durante 6 horas.

Puede tomar un vaso de agua **hasta 2 horas antes** de la exploración de gastroscopia en caso de que tenga sed.

Debe informarnos si tiene **intolerancia/alergia** a algún medicamento, además de enfermedades como angina de pecho, insuficiencia cardíaca o trastornos de la coagulación ya que esto puede afectar a la elección del procedimiento.

Medicinas que afectan a la coagulación:

- Si está tomando **Albyl-E** y no ha recibido ninguna notificación contraria al respecto, puede seguir tomando esta medicación hasta el día de la exploración.

- Si está tomando **Plavix/Brilique/Efient**, debe ponerse en contacto con nosotros antes de la exploración.
- Si está tomando **Xarelto/Eliquis/Pradaxa**, debe dejar de tomarlo 2 días antes de la exploración.
- Si está tomando **Marevan** debe dejar de tomarlo 3 días antes de la exploración, el INR será controlado por nuestro laboratorio. Por esta razón deberá presentarse como mínimo 1 hora antes de la exploración y notificar su llegada en el mostrador del ambulatorio.
- Si le han implantado una válvula cardíaca debe ponerse en contacto con el ambulatorio para planificar el cambio de Marevan (Sintrom) a Fragmin.

Los inhibidores

de la acidez como Omeprazol, Esomeprazol (Losec/Nexium), Pantoprazol (Somac) o Lanzoprazol (Lanzo) **debe dejar de tomarlos 7 días antes** a la exploración si no ha recibido ninguna notificación contraria.

Otros medicamentos inhibidores de la acidez, los llamados bloqueadores H2 (de la bomba de protones) como Tagamet, Pepcid y Zantac, debe dejar de tomarlos 2 días antes de la exploración.

Procedimiento

La exploración suele durar de 5 a 10 minutos. La necesidad de sedantes intravenosos será valorada por el médico que realiza la exploración.

Después de la exploración

Si se le han administrado sedantes, debe reposar en la planta de 1 a 2 horas después de la exploración y no puede conducir durante