

染色肠镜

Kromoendoskopi



重要注意事项:

- 请务必在检查之前清肠- 详情见下面单独段落。清肠不彻底可能会导致检查无法进行或结果无效。
- 检查前5天开始您必须在饮食方面做出一些改变 - 详情见下面单独段落。
- 如果您正在服用稀释血液的药物，可能需要暂时停药 - 详情见下面单独段落。



Lovisenberg Diakonale Sykehus

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Medisinsk poliklinikk

Lovisenberggt. 17

Telefon: 2322 5720



什么是染色肠镜？

染色肠镜是对直肠和大肠的检查（肠镜）。检查时医生将柔性管从直肠插入并将一种色素喷入肠道，目的是更容易检测直肠和大肠的肠黏膜是否有病变。

检查前准备：

清肠：请看单独说明

饮食：请看最后一页

药物过敏及其它疾病：

如果您有药物过敏或患有心绞痛、心力衰竭、月经不调等，请务必告知，因为此信息会影响对检查方法的选择。

影响出血时间的药物：

- 如果您服用**阿司匹林（Albyl-E）**，在未有其它医嘱情况下可以一直服用到检查当天。
- 如果您服用**波立维/替格瑞洛/盐酸普拉格雷（Plavix/Brilique/Efient）**，请在检查之前至少一星期与我们联系。
- 如果您服用**拜瑞妥/阿哌沙班/泰毕全（Xarelto/Eliquis/Pradaxa）**，请在检查前2天停止服用。
- 如果您服用**华法林（Marevan）**，请在检查前3天停止服用。因为检查前须到我院化验室来检测INR（国际标准化比值），所以您应至少提前1小时到达内科门诊并在前台报到。
- 如果您体内植入了机械心脏瓣膜，**请务必事先和门诊联系**，以便医生事先制订从华法林（Marevan）到法安明（Fragmin）的换药计划。

检查过程

检查时间为**1-1.5小时**。检查中可能会有腹胀痛的不适感。如果需要镇静或镇痛药，医生可以提供，护士会事先给您在手臂上装好插管。

检查后

如果检查中使用了镇静剂，检查后您应在诊所休息1-2小时，当日不能开车。

介绍您来的医生几天后会收到检查结果。如做了活检，医生**4-6个星期**后会收到化验结果。

请自己带饭，以便检查结束后食用。

并发症？

检查后的并发症并不常见。如果进行了活检取样或切除息肉，在黏膜上会留下一个小伤口。出血情况罕见，检查**3-4天后**有可能发生，但通常会自动停止。

如果怀疑肠壁受伤，请联系您的固定医生或本院内科门诊值班医生（电话：**23 22 50 00**）。

本院医生不负责开病假条，但可以出具您当日来医院检查的医生证明。